

Aus der Medizinischen Universitätsklinik zu Halle a. d. Saale.
Direktor: Professor Dr. med. Th. Brugsch.

Über das Blutbild der chronischen Bronchitis

Inauguraldissertation zur Erlangung der Doktorwürde der
Hohen medizinischen Fakultät

der

Vereinigten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg

vorgelegt von

Hans Becker

Aus der Medizinischen Universitätsklinik zu Halle a. d. Saale.
Direktor: Professor Dr. med. Th. Brügich.

Über das Blutbild der chronischen Bronchitis

Inauguraldissertation zur Erlangung der Doktorwürde der
Hohen medizinischen Fakultät

der

Vereinigten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg

vorgelegt von

Hans Becker

Meinen lieben Eltern
in Dankbarkeit
gewidmet

Die chronische Bronchitis ist ohne Zweifel eines der verbreitetsten Krankheitsbilder. Das Schrifttum der letzten Jahre zeigt, daß bei dieser Erkrankung in bezug auf Aetiologie und pathologische Veränderungen noch vieles ungeklärt ist.

Besondere Bedeutung gewinnt die chronische Bronchitis bei der Beurteilung der Rentengutachten und bei der Differentialdiagnose gegenüber der Lungentuberkulose. Auffallend war es, daß die Krankengeschichten von Patienten mit chronischer Bronchitis der Medizinischen Klinik in Halle in überwiegendem Maße Gutachterkrankengeschichten waren. Schwenkenbecher berichtete auf der 5. Hauptversammlung der mittelhheinischen Studiengesellschaft für Klimatologie und Balneologie in seinem Vortrag über den eosinophilen Bronchialkatarrh: „daß es vielleicht kein Zufall sei, wenn er bei Landstreichern, die alljährlich mit Beginn des Winters im Krankenhaus Zuflucht suchen, eosinophile Katarrhe relativ häufig sehe. Sehr oft seien es auch Kranke mit dieser Störung, deren zarter, schwächlicher Habitus zusammen mit der chronischen Bronchitis den Verdacht einer Tuberkulose nahe lege.“ Diese Beobachtung wird durch die später angeführten Krankengeschichten vollauf bestätigt. Ich glaube, daß ebenso wie bei den Landstreichern der Wunsch, für den Winter versorgt zu sein, auch bei den Begutachteten der Wunsch, eine Rente zu erlangen (Rentenpsychose), für die Beurteilung eine Rolle spielt.

Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, daß gerade die Typen der Astheniker, Psycholabilen und Neuropathen eine besondere Neigung zu Katarrhen und besonders zu den allergischen Erkrankungen, sei es Heufieber, Asthma, ein Hautleiden oder eine andere allergische Reaktion, zeigen. Diese Tatsache hebt das konstitutionelle Moment, als wichtigsten Faktor der Pathogenese, in den Vordergrund. Deshalb nimmt es nicht wunder, daß man chronische Bronchitiden schon im Säuglings- und frühen Kindesalter antrifft. Viele dieser Kleinkinder behalten ihren Katarrh mit kürzeren oder längeren Intervallen anscheinender Gesundheit bis ins späteste Alter bei. Man muß annehmen, daß diese Erscheinung auf eine individuelle Disposition zurückzuführen ist. Viele Autoren wie Henoeh, Heubner, Feer,

M. Meyer, Rachford, Allan, West konnten feststellen, daß es sich bei den Kindern, die an chronischen Erkrankungen der Atmungswege litten, meist um konstitutionell abnorme oder schwächliche Kinder handelte. Lederer sagt, daß man bei gewissen Fällen direkt von einer Organminderwertigkeit des Respirationstraktes, die sich bisweilen als von der Ascendenz vererbt darstellt, sprechen kann. Doch nicht allein die Disposition, sondern auch andere an und für sich geringfügige Erkrankungen des Kindesalters können der chronischen Erkrankung den Weg ebnen. So sieht Ch. Miller in Masern und Keuchhusten die häufigsten Vorläufer chronischer Bronchial- und Lungenprozesse. Ebenso hat Lederer die Ansicht vertreten, daß vor allem die banalen Bronchitiden und Bronchopneumonien die Anfänge der späteren chronischen Erkrankung sind. Vogt dagegen hebt die bakterielle Infektion besonders durch den Influenzabazillus hervor; sonst wird jedoch im allgemeinen der bakteriellen Infektion eine Nebenrolle zugeschoben. F. von Müller sagt das bei seiner Charakterisierung der chronischen und der akuten Bronchitis mit folgenden Worten: „Der chronischen Form liegt gewöhnlich eine dauernde, anatomische Gewebsveränderung der Bronchien oder eine Konstitutionsanomalie zugrunde, und dabei spielt die bakterielle Infektion nur eine sekundäre Rolle, während die akute Bronchitis in der Hauptsache die Folge einer Infektion darstellt. So konnte Hilding Bergstrand bei zwei Fällen von Asthma bronchiale, die zur Sektion kamen, feststellen, daß die Bronchien kein bakterielles Exsudat, sondern die Produkte der in Becherzellen umgewandelten Flimmerepithelien enthielten.

Bei der Pathogenese der kindlichen chronischen Bronchitis spielen vor allem die Rachitis und die exsudative Diathese Czernys mit die wichtigste Rolle; Stäubli stellte sogar den neuen Begriff der „eosinophilen Diathese“ auf, deren Erklärung durch die heutige Allergielehre gegeben ist. Auf der Grundlage obengenannter Erkrankungen entwickeln sich dann die chronischen Lungenerkrankungen in ihren verschiedensten Formen. Henschel konnte schon für die sterotoröse Tracheobronchitis der Rachitiker mitunter feststellen, daß eine Erkältung unmittelbar oder bald nach der Geburt, sei es durch ein zu kühles Bad oder ein kaltes Zimmer oder durch Austragen bei schlechtem Wetter, den ersten Grund zu dem Katarrh legte, der sich durch große Hartnäckigkeit auszeichnete.

Mit diesen Tatsachen konnte man aber nur einen geringen Prozentsatz der Bronchitiden erklären. Das große Verdienst Pirquets und Schicks ist es, auf die Bedeutung der Allergie hingewiesen zu haben. Pirquet war es, der die Lehre der Allergie zunächst auf den veränderten Reaktionszustand, den tuberkulös infizierte Individuen auf Berührung mit Substanzen des Tuberkelbazillus im Vergleich mit gefunden Individuen zeigen, angewendet hat. Heute versteht man

ganz allgemein unter Allergie die Bereitschaft des Organismus auf die Einbringung von Substanzen, denen gegenüber der Körper einen veränderten Reaktionszustand erworben hat, mit Krankheitserscheinungen zu antworten. Mit der Allergie nahe verwandt sind Anaphylaxie und Idiosynkrasie, wenn sie nicht sogar ein und dasselbe sind. So kommt Breinl in seiner Arbeit über Allergie, Anaphylaxie und Idiosynkrasie zu folgendem Ergebnis:

„Bei aller Anerkennung der bestehenden Unterschiede erscheint bei dem heutigen Stand unserer Kenntnisse dennoch die Annahme begründet, daß beiden Gruppen (Anaphylaxie und Idiosynkrasie) ein analoger Wirkungsmechanismus zugrunde liegt. Die Entstehung der Allergie denkt man sich so, daß auf Grund einer Disposition durch ein- oder mehrmaliges Eindringen von solchen Stoffen, die Allergie auszulösen vermögen, der veränderte Reaktionszustand des Körpers ausgebildet, beziehungsweise manifest wird. Hieraus ersieht man schon, daß für die Allergie nicht nur eine bestimmte Substanz maßgebend zu sein braucht, sondern daß auch mehrere Stoffe gleichzeitig ihre Ursache sein können und auch meistens sind. Allergische Krankheiten sind demnach Erkrankungen, bei denen der betreffende erkrankte Organismus eine veränderte Reaktionsfähigkeit besitzt, die sich in einer Ueberempfindlichkeit gegenüber einer oder mehreren körperfremden Substanzen äußert. (Farmer Loeb.)

Da sich in der Literatur die verschiedensten Bezeichnungen für dieselben Krankheitsercheinungen finden, sei hier der Vorschlag von J. Kolmer angeführt, der, um eine Verwirrung zu vermeiden, folgende Bezeichnung vorschlägt:

Allergie anstatt Anaphylaxie, Ueberempfindlichkeit, Idiosynkrasie, Atopie.

Allergen anstatt Anaphylaktogen, Sensibilogen, Sensitinogen, Atopen.

Allergin oder allergischer Antikörper anstatt Anaphylaktin, Sensitizin, Reaktionskörper, Albuminolylin, Präcipitin, Reagin.

Aktive und passive Sensibilisierung anstatt Allersifation.

Defensibilisierung.

Außer der Konstitution, wie bereits erwähnt, spielt nach Balyeat aber auch noch die Vererbung eine wichtige Rolle. Nach seiner Meinung wird aber nur die Fähigkeit zur Sensibilisierung, nicht aber die spezifische Ueberempfindlichkeit vererbt. Darüber hinaus will er aber doch schon bei Neugeborenen durch Testierungen typische spezifische Ueberempfindlichkeit festgestellt haben. Die Vererbung soll nach dem Mendelschen Gesetz erfolgen. Zu den gleichen Ergebnissen kamen auf Grund von Tierversuchen Ratner Bret und Helen Lee Gruchl. Sie setzten Meerschweinchen während der Gravidität so lange Pferdeschuppenstaub aus, bis sie Asthmasymptome

zeigten. Nach der Geburt wurden auch die Jungen exponiert, und diese zeigten dann folgendes:

1. Die respiratorische Anaphylaxie (Asthma) eines trächtigen Meerfchweinchens, durch Inhalation trockenen Antigenstaubes beigebracht, kann von der Mutter auf die Nachkommenschaft übertragen werden.

2. Ein fo in utero sensibilibisiertes Meerfchweinchen zeigt respiratorische Anaphylaxie, wenn es zum ersten Mal mit dem Antigenstaub in Berührung kommt.

3. Die Uebertragung dieser Ueberempfindlichkeit geschieht durch Uebertragung sensibilibisierender Antikörper.

4. Ein Foet kann in utero aktiv sensibilibisiert sein durch eine Mutter, die Antigenstaub eingeatmet hat, selbst aber zur Zeit der Geburt nicht sensibel ist.

5. Dieser Zustand der Ueberempfindlichkeit kann in verschiedenen Intensitätsgraden übertragen werden. Tiere eines Wurfes können in gleichem und verschiedenem Maße sensibilibisiert sein.

6. Die Uebertragung kann durch mehr als einen Wurf geschehen.

An und für sich wäre es denkbar, daß das mütterliche Serum in das Blut der Frucht durch die Plazenta eindringt. Dazu wäre aber eine Verletzung der natürlichen Schranken der Plazenta Voraussetzung, die man aber bis jetzt noch nicht konstatieren konnte.

Wenn also anzunehmen ist, daß die Vererbung bei der Allergie eine Rolle spielt, so steht dennoch die Konstitution im Vordergrunde.

Wir haben nun gesehen, daß sich die chronische Bronchitis meist allmählich, manchmal von der Kindheit her entwickelt. Erwähnt sei noch, daß sie auch in selteneren Fällen im Anschluß an eine akute Bronchitis entstehen kann. Da die chronische Bronchitis in vielen Fällen Symptom oder Folge einer anderen Krankheit sein kann, teilt man sie in primäre und sekundäre Bronchitiden ein. Hoffmann gibt hierfür folgende Einteilung an:

1. Diejenigen Formen, welche als Ausgang einer akuten Bronchitis auftreten. Hierher gehören auch die Bronchitiden nach Masern, Keuchhusten und Grippe.

2. Formen, welche auf Konstitutionsanomalien beruhen (Gicht, Rachitis, Skrofulose, Morbus Brightii). Hierher gehören auch jedenfalls gewisse, bei Ekzematösen beobachtete Formen, die mit den Erscheinungen des Ekzems wechseln.

3. Die Formen, die durch chronisch wirkende Schädlichkeiten zustande kommen (Potatoren, Raucher, Staubarbeiter).

4. Personen mit Krankheiten der Nase und des Nasenrachens, die durch den Mund atmen müssen und auf diese Weise die Luftwege besonders leicht schädigen können.

5. Personen mit Zirkulationsstörungen (Herzranke, Fettleibige).
6. Alle Lungenkrankheiten.

Diefes Schema ift ohne Berücksichtigung der Allergielehre aufgestellt worden, läßt aber fchon deutlich die Trennung der primären von der fekundären Bronchitis erkennen. Primär find ohne Zweifel alle die Formen, welche unter 1—3 aufgeführt find. In gewiffem Sinn kann man auch die unter 4 verzeichneten dazu rechnen, obwohl zwar eine Erkrankung der Nafe die Vorbedingung ift, es fih jedoch fchließlich je nach Länge der Erkrankung um eine mehr oder weniger fchwere primäre Schädigung des Bronchialbaumes handelt. Sekundär find alle diejenigen Bronchitiden, die im Verlauf von Zirkulationsstörungen auftreten. Zu ihnen find außer den genannten noch die Bronchitiden bei Nierenerkrankungen zu rechnen. In diefen Fällen verfchwinden nach Befeitigung der kardialen Stauungserfcheinungen auch die Erfcheinungen von feiten der Bronchien. Zu 6 wären noch die Erkrankungen der Pleura hinzuzufügen.

Aufgabe vorliegender Arbeit foll es nun fein, das Blutbild der chronifchen Bronchitis in bezug auf feine Zufammenfetzung und fein Verhalten während der Erkrankung zu betrachten und womöglich daraus diagnostifche Schlüffe zu ziehen. Es würde über den Rahmen der Arbeit hinausgehen, wollte man auch die fekundären Bronchitiden in die Betrachtungen einbeziehen. Es follen hier nur die primären Bronchitiden herangezogen werden, da ja bei den fekundären die Bronchitis durch das Hauptleiden erklärt werden kann. Auch das Blutbild der chronifchen Bronchitis bei Lungenerkrankungen, die als felbftändige Krankheitsbilder anzufehen find, werden nur für Asthma bronchiale, Emphyfem und Lungentuberkulose vergleichend geftreift werden. Im folgenden wird alfo nur die chronifche Bronchitis als Krankheit sui generis behandelt werden.

Welche klinifchen Erfcheinungen zeigt nun die chronifche Bronchitis? Die Kardinalsymptome find chronifcher Huften und Auswurf und mit zunehmender Schwere der Erkrankung auch Atemnot. Bei den meiften Fällen bildet fih fchon in kürzefter Zeit eine Lungenblähung heraus; der Bruftkorb zeigt die typifche Faßform des Emphyfems, und dann macht fih auch bald die dadurch bedingte Beeinfluffung des Kreislaufes bemerkbar. Schließlich kommt es in verftärktem Maße noch durch Infizierung des Bronchieninhaltes durch Bakterien zu Bronchiektafenbildungen, befonders in den Untertappen. Der Huften und die Menge des Auswurfes find großen Schwankungen unterworfen. Vom einfachen Reizhuften bis zu einem erftickungsähnlichen Huften find alle Uebergänge anzutreffen. Es gibt Fälle faft ohne jeglichen Auswurf, in anderen wird er in großen Mengen entleert. Der Auswurf felbft kann zäh-fchleimig, fchleimig-eitrig, mehr ferös oder auch rein eitrig fein. Je nach der Befchaffenheit und der Menge des Auswurfes ift auch der auskultatorifche Unterfuchungsbefund verfhieden. Bei trockenem Katarrh wird

man also hauptsächlich Schnurren, Giemen und Pfeifen antreffen, wohingegen man bei den feuchten Formen in überwiegendem Maße feuchte Rasselgeräusche wahrnehmen wird. Teichmüller gibt für die eosinophile Bronchitis folgende Auskultationsbefunde:

„Man hört neben bronchitischen, feuchten Rasselgeräuschen hauptsächlich die trockenen, schnurrenden, giemenden und pfeifenden Rhonchi. Besonders die letzteren sind ungemein charakteristisch mit einer Verlängerung des Expiriums. In der Mehrzahl der Fälle werden die Geräusche diffus über beiden Lungen auskultiert werden. Wenn sie mehr über einem Lungenabschnitt lokalisiert sind, so treten an Stelle der sonst stets überwiegenden trockenen Rasselgeräusche die mittelgroßen bis kleinblasigen Rhonchi. Bei der Perkussion wird man meist eine, wenn auch geringe, Aufhellung des Klopfschalles besonders über den unteren Lungenpartien feststellen, wenn nicht eine Sekretanhäufung in den Bronchien eine Dämpfung bedingt. Je nach der Stärke des Emphysems wird man verschieden helle Abschattierungen des Klopfschalles bis zur Tympanie feststellen können.

Der Verlauf der chronischen Bronchitis ist meist fieberlos. Wie schon oben erwähnt, ist das Befinden des Kranken, was das Allgemeinbefinden und auch die einzelnen Symptome wie Husten anbelangt, sehr wechselnd. Das Anfangsstadium der Erkrankung kommt meist nicht zur Beobachtung, da die Kranken erst dann den Arzt aufsuchen, wenn die Erkrankung schon weiter fortgeschritten ist. Fast immer werden Brustschmerzen angegeben. Außerdem klagen die Patienten über Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Verstopfung, schlechten Schlaf und auch über Schweißausbrüche. Es finden sich Unterbrechungen der Krankheit durch kleinere oder größere Intervalle eines vollständig guten Befindens. Immer jedoch besteht eine große Neigung zu Rezidiven und besonders starke Empfindlichkeit gegenüber schlechter Witterung.

Zur Sicherung der Diagnose einer chronischen Bronchitis gehören noch folgende Untersuchungsmethoden:

1. das Röntgenbild der Lunge,
2. die mikroskopische Untersuchung des Sputums.

Gerade wegen der Schwierigkeiten der Differentialdiagnose gegenüber der Tuberkulose müssen diese beiden Untersuchungen unbedingt angestellt werden, wenn man sich nicht einer groben Fahrlässigkeit schuldig machen will.

Ueber die mikroskopische Untersuchung des Sputums wäre zu sagen, daß es außer bei der allergischen Bronchitis keine besonders charakteristischen Bestandteile enthält. Man findet gelegentlich Leukocyten, Epithelien, Fettsäurenadeln, Flimmerepithelien, Bakterien und manchmal Charkot-Leydensche Asthmakristalle; letztere finden

sich häufiger bei allergischer Bronchitis, bei welcher man meistens auch eosinophile Zellen im Sputum nachweisen kann.

In der Literatur findet man verschiedene Formen von chronischer Bronchitis angeführt, die eine Differenzierung meist nach der Art des Sputums aufweisen. Man findet dort den Catarrhe sec (Laennec), die Bronchoblennorrhoe, den Catharrus pituitosus und das Asthma humidum. Meiner Meinung nach ist eine solche Differenzierung zu wenig aufschlußgebend, da sie nur einen geringen Hinweis auf die Aetiologie, gar keinen auf die Therapie in sich trägt. Ich glaube, daß man eine Einteilung, die diesen beiden Forderungen gerecht wird, nur durch das Blutbild finden kann.

Wie groß die Bedeutung des Blutbildes ist, soll an folgendem Fall erläutert werden.

E. F., Witwe, 38 Jahre alt.

Familienanamnese: Vater wahrscheinlich an Luftröhrenkrebs gestorben. Mutter und zwei Geschwister leben und sind gesund. Mann tot (Suizid), war stets gesund. Zwei gesunde Kinder.

Eigenanamnese: Als Kind Diphtherie, im Anschluß daran doppelseitige Mittelohrentzündung. Seit dieser Zeit ist Patientin schwerhörig. Mit 14 Jahren Tonsillektomie, trotzdem bekam sie später noch zweimal schwere „Geschwüre im Hals“. 1917 angeblich Kopfgrippe.

Seit einem Vierteljahr leidet Patientin dauernd an Luftmangel. Vor mehreren Wochen plötzlich Schüttelfrost, 14 Tage bettlägerig. Dann zwang sie sich wieder zur Arbeit, obwohl sie sich noch sehr schlecht fühlte; kalte Hände, Hitzegefühl im Kopf, Appetitlosigkeit. Einmal habe sie 39 Grad Fieber gehabt. Seit vier Wochen besteht Husten, es sind stechende Schmerzen besonders links hinten oben aufgetreten. Patientin klagt über schlechten Schlaf; sie hat reichlichen Auswurf von hellgelber Farbe. Vor drei Wochen mußte sie infolge des starken Auswurfes mehrmals erbrechen. Seit dieser Zeit bestehen auch ziehende Schmerzen im linken Unterarm und Ellenbogen. Aerztliche Behandlung besserte den Hustenreiz, die Brustschmerzen blieben weiter bestehen. Sie ziehen jetzt von der linken Seite über dem Herzen bis zum Brustbein, dehnen sich aber auch über die ganze Brust aus. Nachts öfters stärkere Atembeschwerden; außerdem klagt Patientin über große Mattigkeit und Augenflimmern. Appetit seit vier Tagen etwas besser.

Patientin leidet schon seit längerer Zeit an Obstipation.

Befund: Reduzierter Ernährungszustand. Wangen hektisch gerötet. Glanzen. Atmung beschleunigt. Muskulatur schlaff, Fettpolster stark reduziert. Pupillen weit, rund, reagieren prompt auf Lichteinfall und Convergenz. Lippen etwas cyanotisch. Gebiß im Unterkiefer leidlich erhalten, im Oberkiefer Prothese. Rachen gerötet, Tonsillen klein. Zunge rot, nicht belegt.

Thorax: von athletischer Form. Zwischenrippenräume eingefunken. Linke Seite bleibt bei der Atmung zurück. Lungengrenzen hinten 11. Brustwirbeldornfortsatz, links einen, rechts einen halben Querfinger breit verschieblich. Ueber der linken Spitze ist der Klopfeschall verkürzt, das linke Spitzenfeld ist schmal. Atemgeräusch: rechts klingende, kleinblasige Rasselgeräusche im Mittelfeld; rechts hinten unten mittelblasige, klingende Rasselgeräusche und etwas Giemen; links oben Giemen, mittel- und kleinblasige Rasselgeräusche an der Schulterblattspitze. Vorn links oben etwas verschärftes Expirium; rechts unten vereinzelte Rasselgeräusche. Herz: Herzgrenzen rechts 4 cm, links 10 cm, oben dritte Rippe. Gefäßband breit, Herztaille verstrichen. Herzaktion regelmäßig, beschleunigt. Ueber der Herzbasis trockenes, pericarditisches Reiben. Blutdruck: 90/40 mm Hg. Puls: 114 Schläge in der Minute, beiderseits gleich.

Abdomen: Milz und Leber o. B. Kein Druckschmerz, keine Resistenz tastbar.

Extremitäten: am linken Unterschenkel Vitiligo.

Reflexe: Sehnenreflexe normal, keine pathologischen Reflexe. Rechter oberer Bauchdeckenreflex nicht auslösbar.

Wassermannsche Reaktion: negativ.

Urinsediment: einige Erythrocyten.

Der Blutstatus zeigt folgendes Bild:

Hämoglobin: 84%. Erythrocyten: 4,17 Millionen. Leukocyten: 14 200. Färbeindex: 1. Blutkörperchenfenkungsgeschwindigkeit: 61/91 mm. Differentialbild: Eosinophile = 54%, Stabkernige = 1%, Segmentkernige = 30%, Lymphocyten = 15%.

Die Stuhluntersuchung ergab keinen Anhalt für Darmparasiten. Im Sputum sind keine Tuberkelbazillen nachweisbar, dagegen finden sich massenhaft Eosinophile.

A, T. 1 : 10 000 und 1 : 50 000 = (+).

Die Röntgenaufnahme der Lunge zeigt beide Unterfelder und Sinus verschattet. Die ganze linke Seite zeigt Streifen und Fleckschatten. Pericard o. B.

Es wurde die Diagnose einer eosinophilen Bronchitis gestellt, auf Grund der hohen Eosinophilie sowohl des Blutes als auch des Sputums. Patientin wurde sechs Wochen beobachtet, wobei das Verhalten des Blutbildes laufend kontrolliert wurde. Die Blutentnahmen wurden immer morgens nüchtern vorgenommen nach einem Handbad von 20 Grad Wärme und 10 Minuten Dauer (Mayr und Monkorps). Gefärbt wurden die Ausstriche nach der kombinierten May-Giemsa-Färbung nach Pappenheim, es wurden jedesmal mindestens 200 Leukocyten ausgezählt.

Es fanden sich folgende Werte:

Datum	Hb.	Erythrocyten.	Leuko-cyten	Basophile	Eosinophile	absolute Zahl der Eos. pro cbmm.	Stabkernige	Segmentkernige	Lymphocyten.	Gr. Monocyten	
24.5.	84	4,17	14200		54	7668	1	30	15		Senkung: 61/91 mm
3.6.			11300		34	3842		35	31		
4.6.			8400	2	43	3612	2	34	19		
13.6.			7600		27	2052	2	38	26	7	
21.6.					51		1	23	24	1	
24.6.	90	4,53	9400		47,5	4465	1,5	31,5	18,5	1	
25.6.					53,5		1,5	30	13	2	
26.6.			7600		56	4256	1	24	16,5	2,5	
27.6.			12600		53,5	6741	1	25	19	1,5	
28.6.			11800		48	5664	1	25	23,5	2,5	
29.6.			14000		53,5	7490	1	25,5	18	2	
1.7.			15600		47,5	7410	1	31,5	17,5	2,5	Senkung: 14 mm
4.7.			10200		44	6248	2	33,5	17	3,5	1. Ponndorf-Impfung
7.7.			9200		51,5	4738	1,5	28	17	2	Senkung: 35 mm
10.7.			8600		46,5	3999	0,5	20,5	30,5	2	2. Ponndorf-Impfung
14.7.			8000	1	54	4320	1	21	21	2	Senkung: 22 42 mm 16.7. 3. Ponndorf-Impfung
18.7.			8200	0,5	24,5	2009	2,5	55,5	15	2	
21.7.			6200		29,5	1829	1,5	25,5	42	1,5	Senkung: 18 mm
24.7.			9200	0,5	35,5	3266	0,5	33	26,5	4	
28.7.			7800	1	29,5	2301	0,5	43,5	24	1,5	
4.8.			9000		36,5	3285	1,5	34,5	25	2,5	
22.9.			5800		20	1160		49	26	3	
11.1.					29,5			36,5	32	2	Senkung: 3 mm
23.2.				1	13,5			45	37	3,5	

Aus obiger Tabelle kann man ohne weiteres das starke Schwanken der Werte für die Eosinophilen und auch für die Leukocyten erkennen. Wie weit besteht nun ein Zusammenhang zwischen subjektivem Befinden und Blutbild? Es zeigte sich bis Mitte Juni eine langsame Besserung mit einer Gewichtszunahme von fast 2,5 kg. Der Befund über der Lunge hatte sich wesentlich gebessert. Eine Röntgenaufnahme am 5. 6. zeigte, daß die Fleckschatten verschwunden sind, aber jetzt ist ein breiter Herzschaten vorhanden. Dann setzte wieder eine Verschlechterung ein, die am 11. 7. zu einem Anfall schwerer Atemnot führte. Am nächsten Morgen war über der ganzen Lunge

diffuses Giemen und Brummen zu hören. Patientin gab an diesem Tage auf Befragen an, daß sie niemals vorher einen derartigen Anfall gehabt habe. Eingefügt sei hier, daß Patientin am 4. 7. eine Ponndorf-Impfung von 1 cm² und am 10. 7. eine solche von 3 cm² erhalten hatte. Inwieweit dieser Anfall auf die Impfungen zurückzuführen ist, sei dahingestellt. Nach der dritten Impfung am 16. 7. (7 mal 6 cm im Quadrat) machte sich eine rapide Besserung bemerkbar. Am Tage der Impfung selbst bestand noch größere Atemnot, aber schon am nächsten Tage ließ sich kein pathologischer Auskultationsbefund mehr erheben. Patientin war in der Folge bis zum Tage ihrer Entlassung am 30. 7. vollkommen beschwerdefrei. Man kann aus der Tabelle hierzu ersehen, daß eine Besserung im Befinden meist eine, wenn auch nicht konstante, Verminderung der Eosinophilie zur Folge hat.

Schon am 4. 8. kam Patientin wieder in die Klinik, da sie schon in der ersten Nacht nach ihrer Rückkehr in ihre eigene Wohnung starke Atembeschwerden bekommen hatte. Es fand sich wieder über beiden Lungen starkes Giemen und Brummen, die Eosinophilen waren wieder angestiegen. Patientin kam nun zur Kur nach Bockswiese, wo sie sich sehr gut erholte. Anfälle von Atemnot waren dort nicht aufgetreten. Sofort nach ihrer Rückkehr kam es zu sehr heftigen Anfällen, besonders in ihrer Wohnung, aber auch auf der Straße. Sie waren tags und nachts gleich. Es handelte sich jetzt um typische asthmatische Anfälle. Bei der erneuten Aufnahme in die Klinik ergibt sich folgender Befund:

Im allgemeinen unverändert. Guter Allgemeinzustand, gesundes Aussehen und weitere Gewichtszunahme. Stärkere Atemnot mit geringer Cyanose. Keine Oedeme. Lunge: Grenzen tiefstehend am 12. Brustwirbeldornfortsatz, wenig verschieblich. Klopfschall o. B., Atemgeräusch: diffuses Giemen und Brummen über der ganzen Lunge. Herz: nicht verbreitert, Töne: leise, rein.

Röntgenaufnahme der Lunge: horizontaler Rippenverlauf, helle Lungenfelder, kräftige Strangzeichnung, kleines Cor. Das Blutbild zeigt 29,5% Eosinophile; im Sputum finden sich massenhaft Eosinophile.

Nach acht Tagen werden im Stuhl Bandwurmglieder (*Taenia saginata*) gefunden. Es wird eine Bandwurmkur durchgeführt, mehrere Meter Wurm gehen ab, doch ist ein Kopf nicht zu finden.

Unter Jodkali allmähliche Besserung, die am 13. 2. bei einer Eosinophilie von 13,5% zur Entlassung führt.

Wir sehen hier, wie sich aus einer seit einem Vierteljahr bestehenden eosinophilen Bronchitis nach kürzeren oder längeren Intervallen vollkommenen Wohlbefindens ein Asthma bronchiale entwickelt. Teichmüller hält zwar die eosinophile Bronchitis mit dem

echten Asthma für nahe verwandt, doch glaubt er, daß sie wenig Neigung hat, in die typische Form des Asthmas überzugehen. Er konnte als erster Autor zwischen beiden Krankheitsbildern alle Uebergänge feststellen, weshalb er auch den eosinophilen Katarrh als ein „rudimentäres Asthma“ bezeichnete. Schwenkenbecher hingegen stellt fest, daß die eosinophile Bronchitis besonders oft bei Mitgliedern von Asthmafamilien zu finden ist, und daß sie „auch der häufige, meist verkannte Vorläufer echter, kompletter, asthmatischer Zustände ist, der chronisch rezidivierend und exacerbierend bisweilen viele Jahre lang dem ersten Asthmaanfälle vorausgeht“. Er kommt zu dem Schluß, daß Asthma und eosinophiler Katarrh als wesensgleiche, wenn auch verschieden starke und an verschiedenen Stellen des Bronchus sich abspielende Reaktionen sind. Diese letztere Ansicht ist meiner Meinung nach die richtige. Daß das eosinophil-katarrhalische Vorstadium so wenig bekannt ist, liegt sicherlich auch daran, daß die allergisch Erkrankten erst dann den Arzt auffuchen, wenn sich das Asthma entwickelt hat.

Als zweites wichtiges Ergebnis der oben angeführten Krankengeschichte ist die Tatsache hervorzuheben, daß eine zweimalige Verschlechterung der Bronchitis nach Rückkehr in die Wohnung erkennen läßt, daß das für die Erkrankung verantwortliche Allergen mit größter Wahrscheinlichkeit dort zu finden ist. Storm van Leeuwen, W. K. Krause und Tissot van Patot stellten fest, daß Hausstauballergene in der Hauptsache die Ursache allergischer Erkrankungen sind. Sie fanden bei 120 Asthmatikern 78% positive Reaktionen auf Hausstauballergene.

Wie verhält sich nun das Blutbild während der Beobachtungsdauer? Wir sehen erstens die hochgradige Eosinophilie, zweitens, daß die Eosinophilie dauernden Schwankungen unterworfen ist. Drittens ist es auffallend, daß sowohl am 24. 6., als auch nach dem 11. 7. höhere Prozentwerte gefunden wurden, als an den Tagen des besseren Befindens. Während in der Zeit vor dem 24. 6. röntgenologisch und auch auskultatorisch eine Besserung festgestellt werden konnte, machte sich am 24. selbst stärkeres Giemen bemerkbar. Deutlich tritt diese Erscheinung am 11. 7., dem Tage des plötzlichen Anfalles schwerer Atemnot, in Erscheinung, woraufhin beim nächsten Blutbild eine Erhöhung der Eosinophilenprocente um 7,5% eintritt. Auch später nach der ersten Entlassung der Patientin kam sie mit einer höheren Eosinophilie zur Untersuchung, nachdem sie einen oder mehrere Anfälle von Atemnot gehabt hatte. Viertens wurde der niedrigste Wert für die Eosinophile gefunden, nachdem der asthmatische Zustand manifest geworden war.

Zu 1. und 2. Die sehr hohe Eosinophile des Blutes sowohl, als auch die des Sputums lassen die Allergie erkennen. Mayr und Monkorps bezeichneten die Eosinophilie als „das feinste Reagenz aller-

gischer Vorgänge“. Als Normalzahlen nimmt man 3% = 280 Zellen im ccm an (Morawitz). Dieser Wert schwankt bei Erwachsenen zwischen 2—4%; bei kleineren Kindern findet man gewöhnlich etwas höhere Werte bis 5% (Stäubli). Ueber die Entstehung der Eosinophilie nimmt man heute im allgemeinen an, daß von den Gewebstellen, an denen die Allergie sich örtlich manifestiert, ein bestimmter Reiz zu den blutbildenden Organen fließt, der zu einer Auschwemmung der α -granulierten Leukocyten zu der Stelle der allergischen Entzündung führt. Darüber, daß die eosinophilen Zellen aus dem Knochenmark stammen (Stäubli, Nägeli, Hajos), dürfte jetzt wohl Einigkeit herrschen, nachdem man längere Zeit an eine lokale Genese an der Stelle der spezifischen Reaktion geglaubt hatte (Weidenreich, Pavel und Brancovici). Die gleichzeitige Vermehrung der Eosinophilen im Blut und im Knochenmark spricht eindeutig für die vorwiegende Entstehung dieser Zellen im Knochenmark (Schlecht). Liebreich glaubte 1923 durch seine „In vitro Versuche über Eosinophilie“ beweisen zu können, daß Zellen, die bis dahin nicht eosinophil waren, in vitro eosinophil werden, und daß der sich dabei abspielende Vorgang eine Kristallisation ist. Diese Ansicht beruhte auf der Erlich'schen Annahme, daß die Leukocytengranula endogene Bildungen, das heißt, spezifische Produkte einer sekretorischen Zelltätigkeit sind.

Liebreich behauptete weiter, daß die Granula Kristalle sind, und daß ihre Muttersubstanz und die der Charkot-Leyden'schen Kristalle identisch seien. Das Sekret erstarrt als Charkot-Leyden'sche Kristalle und als eosinophile Zelle. Die Muttersubstanz dürfte ein Bestandteil des Fibrin sein. Die Versuche Liebreichs wurden von Mayr und Monkorps kontrolliert und von ihnen als nicht bewiesen abgelehnt, da bei ihren Versuchen die Zahl der Charkot-Leyden'schen Kristalle oft im Gegensatz zu der Zahl der Eosinophilen stand und zwischen der Zahl der eosinophilen Zellen und der angeblich in vitro entstandenen ein direkter Parallelismus bestand. Gleichzeitig damit wiesen Mayr und Monkorps darauf hin, daß zwei weitere Faktoren bei der Schwankung der Eosinophilen maßgebend sind: 1. das autonome Nervensystem und 2. die Milz. Daß das autonome Nervensystem großen Einfluß auf die Schwankungen der Eosinophilen hat, erkannten zuerst Hajos, Nemeth und Enyedy, die durch faradische Reizung des Vagus bei Meerschweinchen deutliche Eosinophilie hervorrufen konnten. Mount Harry erzielte durch Vagusreizung typische asthmatische Anfälle. Für die Beteiligung des Vagus spricht auch, daß man durch Injektion von Adrenalin oder Giften der Muskarin — und Atropingruppe trotz Einwirkens eosinotaktischer Substanzen auf die Lungenoberfläche, ja sogar wenn sie in die Blutbahn selbst gelangten, eine Hypereosinophilie vermeiden oder eine schon vorhandene herabdrücken kann. Hierüber sind allerdings die Ergeb-

nisse noch unterschiedlich (Schwenker, Schlecht, Barath). Dafür, daß die Milz eine Einwirkung, und zwar im hemmenden Sinne hat, spricht die Tatsache, daß nach Injektion von enteweißstem Milz-extrakt eine Senkung der Eosinophilen einsetzt, ja, daß man bei allergischen Erkrankungen der Haut darüber hinaus eine Besserung der Hauterscheinungen bis zum völligen Verschwinden beobachten kann (Mayr und Monkorps, Gasset, E. Smits). Auch das Auftreten einer Eosinophilie nach Splenektomie, oft erst nach längerer Zeit, spricht für diese Ansicht (Luzzatto, Mayr und Monkorps).

Aus diesen Erfahrungen heraus wurde auf dem Wege über die Milz immer wieder versucht, besonders das Asthma bronchiale zu behandeln. Waldbott, Holst und Kaplunowa haben durch Röntgenbestrahlungen der Milz angeblich gute Erfolge erzielt.

Bisher nahm man an, daß besonders durch die Ueberschwemmung des Organismus mit toxischen Abbauprodukten (Türk, Stäubli) durch das Fieber (Zappert) oder durch einen geringeren Bedarf (Ar-neth) die Schwankungen der Eosinophilen bedingt werden. Ziegler kam zu der Ansicht, die jetzt wohl am meisten anerkannt ist, daß nämlich die reaktive Tätigkeit des Organismus im Vordergrunde steht. „Nicht das krankmachende Agens selbst wird für die An-sammlung der α -Zellen beansprucht, vielmehr scheinen die durch me-tabolische Vorgänge (Abbauprodukte) des im Kampf befindlichen Organismus entstandenen toxischen Abbauprodukte den eosinotakti-schen Reiz ausüben.“ Durch diese Ansicht wird auch das häufige Vorkommen von Eosinophilen in der Nähe von Carcinomen erklärt (Mayr und Monkorps).

Zu 3. Am umstrittensten bei der Schwankung der Eosinophilen-kurve ist das Verhalten derselben im Vergleich zur Verschlechterung beziehungsweise Besserung des Leidens. Unsere Beobachtung, daß an den Tagen der stärkeren Krankheiterscheinungen die Eosinophilen ansteigen, wurde zuerst von Hajos mitgeteilt, der bei mit Pferde-serum sensibilisierten Meerschweinchen, welche er Pferde-serum aus-setzte, schwere asthmaähnliche Anfälle erlebte. Bei diesen fand er dann 12 bis 24 Stunden nach dem Anfall die höchsten Werte für die Blut- und Lungeneosinophilie. Dieselben Beobachtungen machte auch Klinkert und von Noorden. Im Gegensatz hierzu stellte Uffen-heimer fest, daß auf der Höhe der Erkrankung die Eosinophilie ver-hältnismäßig niedrig ist, sie kann dabei unternormal oder erhöht sein. Kommt es zur Besserung, so erhöht sich die Eosinophilenzahl, kommt es zur Verschlechterung, so erniedrigt sie sich wieder. Diese Erscheinung entspricht der Erklärung von Heinicke und Deutsch-mann, welche die rapide Abnahme der Eosinophilie des Blutes mit Ein-setzen des (asthmatischen) Anfalls mit einer massenhaften Einwande-rung dieser Zellform in den Brochialbaum erklärten. Der Ersatz

seitens des Knochenmarks kann nicht parallelisiert werden; die Mehrleistung des Marks wird erst später am zweiten Tage nach dem Anfall erkennbar an dem starken Ansteigen der eosinophilen Zellen. Storm van Leeuwen dagegen kommt in seiner Arbeit über „Bluteosinophilie bei Allergikern“ zu dem Ergebnis, daß zwischen Eosinophilie und Asthmaerrscheinungen kein Zusammenhang besteht. Während der guten Perioden kann die Eosinophilie hoch oder niedrig sein, ebenso während der schlechten Perioden. Er stellt den Satz auf: „die Bluteosinophilie gibt keine Indikation für den Grad der allergischen Erkrankung.“ (Baagoe.)

Obwohl die Ansichten von Hajos und Klinkert mit unseren Befunden für die Prozentwerte übereinzustimmen scheinen, ergibt sich bei der Betrachtung der absoluten Zahl der Eosinophilen einmal eine Senkung der Zahl, während sie das zweite Mal gestiegen ist. Nur bei der Untersuchung am 4. 8. sind beide Zahlen höher. Es läßt sich meiner Meinung nach keine Norm für die Beziehungen zwischen dem Schwanken der Eosinophilen und der Aenderung der Krankheitserscheinungen feststellen.


Der rapide Sturz der Eosinophilen zwischen dem 14. und 18. 7. ist sicherlich als therapeutischer Effekt der Ponndorf Impfungen anzusehen. Wir sehen, daß hier sowohl die Eosinophilenprozente, als auch die absolute Zahl sinken und eine geringe Vermehrung der Leukocyten eintritt. Storm van Leeuwen fand nach Injektion von Schwefel oder Terpentin meist ein Steigen der Leukocytenzahl, während die relative und absolute Zahl der Eosinophilen absank. Er hält diese Erscheinung nicht für eine spezifische Wirkung des Schwefels oder des Terpentins, sondern seiner Meinung nach kann jede Reiztherapie ähnliches hervorrufen.

Zu 4. wäre zu sagen, daß bisher in der Literatur über gleiche Beobachtungen nichts vorliegt. Es kann natürlich auf Grund dieses einen Falles keine Norm aufgestellt werden, es sind weitere Beobachtungen abzuwarten. Wie verhält sich nun die Eosinophilie zur Temperatur?

Tafel I. Seite 17.

Wir können hier beobachten, daß an einzelnen Tagen (3., 13., 24., 28. 6. und 18. 7.) bei höherer Temperaturlage eine Erniedrigung der Zahl der eosinophilen Zellen eintritt. Uffenheimer hat dieselbe Beobachtung gemacht, daß höhere Grade von Fieber regelmäßig einen Sturz der eosinophilen Zellen hervorrufen. Dasselbe gilt auf Grund seiner Feststellungen für den Hunger. Storm van Leeuwen fand bei Hunger neben der Abnahme der Eosinophilie auch eine Besserung im Befinden, das die Senkung überdauerte. Die Temperaturschwankungen in unserer Kurve sind meiner Ansicht nach zu wenig

24 V 3. II. 5. II. 13. II. 21. II. 24. II. 25. II. 26. II. 27. II. 28. II. 1. III. 4. III. 7. III. 10. III. 14. III. 18. III. 21. III. 24. III. 28. III. 24. I. 18. I.



Eosinophile. Neutrophile. Lymphocyten und Gr. Monocyten.

ausgesprochen, um als Beweis zu gelten; höhere Grade von Fieber kamen nicht zur Beobachtung.

Aus derselben Tabelle kann man auch noch das Verhalten der Eosinophilen, der Neutrophilen und der Lymphocyten + Monocyten mit einander vergleichen. Die Spitzen der Säulen kurvenmäßig verbunden, ergibt dann folgendes Bild.


Tafel 2. Seite 19.

Wir sehen hier besonders am Anfang und am Ende der Kurve, aber auch in einem großen Teil der Mitte, wenn auch dort nicht so ausgesprochen, daß im gleichen Sinne der Schwankung der Eosinophilen eine ebenfolche bei den Lymphocyten + Monocyten eintritt. Zeitlich sehen wir in der Mitte, wo es sich um Blutbilder in kürzeren Intervallen handelt, daß der Anstieg der Lymphocyten meistens früher einsetzt, als der der Eosinophilen. Die Kurve der Neutrophilen dagegen zeigt einen entgegengesetzten Verlauf. Fast jedem Wellental der Eosinophilen entspricht ein Berg der Neutrophilen, der besonders am Schluß sehr deutlich wird, wo es sogar zu einer Ueberschneidung der Kurven kommt. Beobachtungen ähnlicher Art sind bis jetzt, außer von Ziemliski, der gewöhnlich bei der Vagotonie mit dem Ansteigen der Eosinophilen auch ein solches der Lymphocyten fand, nicht beschrieben worden. Bei Helminthiasis fand er sie unabhängig von einander, bei Scharlach und Polyarthrits rheumatica waren die Eosinophilen mit den Neutrophilen vermehrt. Man könnte eventuell hieraus einen Zusammenhang zwischen den Eosinophilen und den Lymphocyten bei der chronischen Bronchitis konstruieren. Ein Anstieg der Eosinophilen bedingt auch einen solchen der Lymphocyten, dagegen einen Fall der Neutrophilen; ein Fallen der Eosinophilen bedingt das Gegenteil.

Es ergeben sich für den 14., 18., 21. 7. folgende Blutbilder:

	Eos.	Neutroph.	Lymphoc. + Monocyten
14.	54	23	23
18.	24,5	58,5	17
21.	29,5	27	43,5

Von den Neutrophilen gehen dabei die Jugendlichen von 1 über 0,5 auf 0 zurück; die Stabkernigen von 1 über 2,5 auf 1,5; die Segmentkernigen von 21 über 55,5 auf 25,5. Die Lymphocyten gehen zuerst von 21 auf 15 zurück, um dann auf 42 zu steigen. Die großen Monocyten zeigen wenig Aenderung. Ihre Werte sind 2—2—1,5. Man ersieht hieraus, daß es hauptsächlich die Segmentkernigen und die Lymphocyten sind, die mit den Eosinophilen großen Schwankungen unterworfen sind, und zwar die Lymphocyten in demselben, die Segmentkernigen im entgegengesetzten Sinn.



Basophile Leukocyten fanden sich am 4. 6. -- 2, am 24. 7. = 0,5, am 28. 7. = 1 und später am 13. 2. = 1.

Die Blutkörperchenfenkungsgeschwindigkeit ging während der Beobachtungsdauer von 61/91 mm (24. 6.) über 35 mm (7. 7.) auf 18 mm (20. 7.) und später auf 3 mm nach Westergreen (22. 1.) zurück.

Das Sputum zeigte noch immer eine starke Eosinophilie. Tuberkelbazillen waren nie nachweisbar, ebenso fehlten bei sämtlichen Untersuchungen Charkot-Leydensche Kristalle und Kurichmannsche Spiralen. Daß niemals Charkot-Leydensche Kristalle auftraten, spricht gegen die von Hajos vertretene Ansicht, der für die Kristalle und die Eosinophilen eine gemeinsame Grundsubstanz annahm, aber auch gegen die von Stäubli, welcher annahm, daß die Kristalle durch Zerfall der eosinophilen Granula entstehen. In unserem Falle mit einer derartig hohen Eosinophilie hätten bestimmt in der Zeit der Beobachtung eosinophile Granula zerfallen müssen, um Charkot-Leydensche Kristalle zu bilden; ebenso hätten sich bei der großen Produktion von Eosinophilen auch Ch.-L. Kristalle aus der gleichen Grundsubstanz bilden können. Es wurden aber, wie schon gesagt, niemals Kristalle gefunden. Es muß also mit von Strümpell angenommen werden, daß es sich bei Asthma, speziell beim Anfall, wo die Ch.-L. Kristalle und Kurichmannschen Spiralen auftreten, um eine durchaus eigenartige Exudation in der Bronchialschleimhaut handelt.

Ueber die Kernform der eosinophilen Zellen im Sputum gegenüber der im Blut ist zu sagen, daß sie im Sputum manchmal zwar eine tiefer gehende Einschnürung in der Mitte zeigt, als sie das Blut aufweist. Oefters waren dagegen die Kerne mehr mononukleär. Dieses stimmt auch mit den Beobachtungen von Heinicke und Deutschmann überein, welche fanden, daß die eosinophilen Zellen des Blutes fast ausnahmslos einen zweilappigen Kern (oft nur wenig gebuchtet) haben, während im Sputum eine Lappung des Kerns häufig nicht mehr deutlich zu erkennen war. Es handelt sich zweifellos im Sputum und im Blut um dieselben Zellenformen.

Die Gesamtzahl der Leukocyten pro Kubikzentimeter schwankte während der Dauer der Beobachtung zwischen 15 60 und 5 800. Ein Verhältnis ihrer Schwankung mit der der Prozentzahl der Eosinophilen läßt sich nicht feststellen; es wurden wohl meist bei höheren eosinophilen Prozentsätzen auch eine höhere Zahl für die Leukozyten gefunden, doch fand sich auch bei einem Anstieg der eosinophilen Prozente ein Fallen der Leukozyten und bei einem Fallen der eosinophilen Prozente ein Anstieg der Leukocytengesamtzahl.

Zu erwähnen wäre noch die in diesem Falle vorhandene ausgesprochene Leukocytose.

Zum Vergleich mit diesem einen Falle seien nun aus dem Material der Medizinischen Klinik in Halle noch weitere 68 Fälle von chronischer Bronchitis angeführt, die nach ihrer Anamnese bis dahin keine typischen asthmatischen Anfälle aufwiesen.

No.	Alter	Geschlecht	Diagnose	Hb.	Erythrocyten	Leukocyten	Basophile	Eosinophile	absolute Zahl d. Eos.	Jug-ndliche	Stabkernige	Segmentkernige.	Lymphocyten	Gr. Monocyten	Senkung
1.	38	w	chr. Bronch.	84	4,17	1420		54	668		1	30	15		61/91
2.	37	m	"	97	4,87	14200		8	1136		2	47	39	4	5
3.	51	m	"	93	5,2	6500		6	390			63	28	3	
			(geheilte Tbc. re. O-Lappen)												
4.	34	m	chr. Bronch.	100	5,16	7300	1		—		2	67	25	5	1,5
5.	30	m	"			6100			—		1	72	25	2	1
			(Emphysem)												
6.	32	m	chr. Bronch.	100	5,24	3800		9	342			57	29	5	2
7.	47	m	"	93	5,15	9800		7	686		4	60	22	7	16
			(Cystitis)	93	4,08	8500		3	255		5	73	15	4	
8.	39	m	chr. Bronch.	95	4,6	9400		6	564		1	44	46	3	
9.	33	w	"			7600		2	152			67	21	10	20
			(nach Grippe)												
10.	29	m	chr. Bronch.	115	5,1	12600		1	126			62	21	6	
			(Urethritis)												
11.	34	m	chr. Bronch.	94	6,05	9400		3	282		2	48	47	1	4
			durch Aether- dämpfe	87	6,1	4200		6	252	1	17	43	26	7	
12.	34	m	chr. Bronch.	94	4,28	7800		3	234			67	26	4	10
			(inakt. Ober- lappentbc.)												
13.	58	m	chr. Bronch.	90	4,98	6900		6	414			69	17	8	15
			(Emphysem)												
14.	35	m	chr. Bronch.	100	5,0	6500	2	3	195			42	47	6	6
15.	36	m	"	93	4,68	6600		8,5	561			63	25,5	3	6
16.	39	m	"	101	6,1	6000		3	180		2	72	22	1	4
			(nach Rauch- vergiftung)												
17.	30	m	chr. Bronch.	100	4,22	4000		3	120			70	21	6	2
18.	52	m	"	110	5,28	7600		4	304		2	61	33		3
			(Emphysem)												
19.	32	m	chr. Bronch.	95	4,8	8800			—		2	60	36	2	4
20.	37	m	"	93	4,93	8800		2	176	4,5	4,5	58	25,5	5,5	4
21.	56	m	"	79	4,13	7000	0,5	1	70		4	59,5	29,5	5,5	7
			(Emphysem)												
22.	28	m	chr. Bronch.	105	4,75	10600		1	106	1	9	60	29		4
			(Pleuraadhäsio- nen)												
23.	35	m	chr. Bronch.	95	4,2	6500		1	65		3	62	29	5	10
			(früher Gas- vergiftung, Bakteriurie)												
24.	53	m	chr. Bronch.	89	5,1	6100			61	1	3	59	33	4	20
			(Emphysem)	91	5,8	4800		2	96			59	38	1	

No.	Alter	Geschlecht	Diagnose	Hb.	Erythrocyten	Leukocyten	Basophile	Eosinophile	absolute Zahl d. Eos.	Jugendliche	Stabkernige	Segmentkernige.	Lymphocyten	Gr. Monocyten	Senkung
25.	41	m	chr. Bronch. (durch Chlor, Emphysem)	82	5,48	6200	1	4	248			58	33	4	20
26.	45	m	chr. Bronch. (leicht. Emphysem, Psoriasis)			10800		2	216		5	66	23	4	11
27.	54	m	chr. Bronch. (Emphysem)	91	5,3	4800	1	2	96		1	57	36	3	12
28.	38	m	chr. Bronch. (Emphysem)	77	4,6	10000	2	6	600		8	62	19	3	20
29.	28	m	chr. Bronch.					35	?		3	34	28		40
30.	10	w	allerg. Bronch. (abgeheilt. Primärkomplex)	87	4,28	10000	0,5	7,5	600	1	9	53	27		
31.	38	m	allerg. Bronch. (Emphysem)	96	4,57	7200	2	4	288			48	41	5	30
32.	50	m	chr. Bronch. (abgeheilte Spigentbc.)	73	3,53	3600	0,5	2	72		4	57	35	1,5	8
33.	54	w	chr. Bronch.					11,5	?		3	41,5	37	7	
34.	55	w	" (Myalgie)	90	4,2	9400	2	2	188		2	53	40	1	
35.	69	w	chr. Bronch.	87	4,36	5300	2	7	364		4	56	24	7	23
36.	21	m	" (Neurasthenie)	92	4,77	11000		1,5	165	2,5	11,5	49	33	2,5	16
				93	4,85	6700		2,5	167,5		4	45,5	38	10	
				93	4,78	6900	1	4,5	310,5		3	41,5	44	6	
37.	51	m	chr. Bronch. (Emphysem)	102	4,63	6800	1	6,5	442			70	19,5	3	1,5
38.	54	m	chr. Bronch. + Laryngitis	91	4,93	7300					3,5	66,5	27	3	29
39.	57	w	chr. Bronch. (Emphysem)	90	3,77	4800	1	15	1020		11,5	45,5	26	1	
40.	55	m	chr. Bronch.	105	5,16	4500		7	315			57	27	9	6
41.	63	m	" (Emphysem)	88	4,2	10200		6	612		2	55	36	1	45
42.	56	m	chr. Bronch. (Emphysem)	95		5800	0,5	2,5	145		6	63	27	1	3
43.	26	w	allerg. Bronch. (Lues 3, Lungeninfarkt, Ohrfurunkel)			9800		5	490		5	52	33	5	7
44.	49	m	chr. Bronch. (Addisson?)	99	4,51	4500		3	135		1	38,5	53	4,5	6
45.	48	m	chr. Bronch. (Emphysem)	94	4,14	6000		1	60		2	90	4	3	
						7200		8	576		5	68	15	4	
46.	40	m	chr. Bronch. Pleurashwarte	102	4,02	9600	1	2	192		4	89	4		
							2	5	?			75	17	1	2
47.	64	m	chr. Bronch. (Myalgie, Spondylitis def.)	98	4,97	6800	0,5	3	204		4	46	40	6,5	2

No.	Alter	Geschlecht	Diagnose	Hb.	Erythrocyten	Leukocyten	Basophile	Eosinophile	absolute Zahl d. Eos.	Jugendliche	Stabkernige	Segmentkernige.	Lymphocyten	Gr. Monocyten	Senkung
48.	53	w	chr. Bronch.	91	4,56	6800	2	5	340	2	1	61	25	4	20
49.	38	m	allerg. Bronch.	104	5,95	11400		7	798			57	33	3	2
50.	51	m	chr. Bronch.	95	5,1	7500	1,5	2	150		5,5	63	21,5	9,5	5
51.	37	m	"	93	4,93	8800		2	176	4,5	4,5	56	26,5	5,5	66
52.	52	m	"	109	5,73	4800	1	6,5	312		2,5	72,5	17,5		2
53.	32	m	"	105	4,7	7600		1	76		2	69	25	3	4
			(Emphysem)												
54.	41	m	chr. Bronch.	103	5,27	10000		6	636	1	2	60	28	3	3
			(Pleuraschwarte rechts)												
55.	54	m	chr. Bronch.	92	4,42	15300	2	2	306		1,5	62,5	27,5	4,5	12
			(Dyspepsie durch verschluck- ten v. Sputum)												
56.	43	m	chr. Bronch.	90	5,22	9800	1	2	196		10	69	16	2	6
			(abgeh. Tbc.)												
57.	52	m	chr. Bronch.	100	4,42	11700	1	2	234		2	67,5	20,5	7	7
						6500		4,5	292,5						
58.	38	m	chr. Bronch.	100	4,73	4400	1	2,5	110		4	58	28	6,5	7
			(abgeh. Tbc.)												
59.	49	m	chr. Bronch.	91	4,21	11400	1		—			65	27	7	4
			(Emphysem)												
60.	38	m	chr. Bronch.	100	5,25	5000		1	50			58	38,5	2,5	2
61.	37	m	chr. Bronch.	102	4,71	6200		8	496	1	1	47	34	7	4
			(Kehlkopfpolyp)												
62.	40	m	chr. Brpnch.	105	5,8	10200		6,5	663	1	3	42,5	37,5	1,5	25
			(abgeh. Tbc.)												
63.	52	m	chr. Bronch.	62	3,25	6200		1,5	93		4,5	70,5	19,5	4	2
64.	17	m	allerg. Bronch.	100	4,6	6000	1	7	420		1	44	41	6	4
65.	13	w	"	93	4,2	6600		7,5	495		0,5	57	33,5	1,5	5
				92	4,53	5600		1	56			57	36	6	
				93	4,87	6000		3,5	210		2	52	37	5,5	
66.	71	m	chr. Bronch.	104	5,96	5800	2	2	116			51	43	2	1
67.	36	m	"	72	3,5	10200		5	510			56	33	6	6
68.	36	w	"	70	4,85	3400		4	136		2	69	24	1	80
69.	36	m	"	93	4,68	6600		8,5	561			63	25,5	3	6

Zu dieser Tabelle ist noch folgendes zu ergänzen. Tuberkelbazillen wurden in keinem Falle gefunden, auch ergab die Röntgenuntersuchung in keinem Falle einen Anhalt für einen aktiven Prozeß in der Lunge. Eine Untersuchung auf eosinophile Zellen im Sputum fand in folgenden Fällen statt.

Nr. 4.	+	Nr. 25.	+
Nr. 5.	+	Nr. 26.	—
Nr. 6.	—	Nr. 28.	+
Nr. 13.	—	Nr. 31.	+
Nr. 22.	—	Nr. 33.	++
Nr. 24.	+	Nr. 34.	+

Nr. 35.	+++	Nr. 50.	—
Nr. 37.	nicht vermehrt.	Nr. 52.	+
Nr. 38.	wenig.	Nr. 57.	+
Nr. 39.	einzelne.	Nr. 59.	—
Nr. 43.	wenig, +, + ++	Nr. 60.	—
Nr. 45.	wenig.	Nr. 65.	+
Nr. 46.	—	Nr. 68.	vereinzelt.
Nr. 48.	—		

Wir sehen, daß die Eosinophilie im Sputum in sehr verschieden starkem Maße auftritt. Eine vergleichende Prozentzahl für die Gesamtzahl der Fälle läßt sich leider nicht geben, da in vielen Fällen keine Untersuchung des Sputums auf Eosinophile stattgefunden hat. Da früher auch dem Blutbild nicht die ihm zukommende Bedeutung zugemessen wurde, ist es schwierig, aus den Krankengeschichten vergangener Jahre in einzelnen Fällen brauchbare Ergebnisse zu entnehmen. Daher kommt auch die Angabe einiger Autoren, daß es zum Beispiel Bronchialasthma ohne Eosinophile im Blute gebe. Es ist dies aber meiner Meinung nach lediglich ein Irrtum, der auf unvollständiger Beobachtung beruht. Schwenkenbecher sagt mit Recht: Es kommt alles auf den Zeitpunkt der Untersuchung an. Man kann bei normaler oder subnormaler Eosinophilenzahl im Blut eine sehr starke Ausscheidung dieser Zellen im Sputum finden und umgekehrt. Die Erklärung dieser Tatsache ist bereits bei der Besprechung der Schwankung der Eosinophilen gegeben worden. Sieht man daraufhin die Tabelle durch, so findet man in den Fällen 4 und 5, daß im Blut die Eosinophilen vollkommen fehlen, während sie im Sputum vorhanden sind. Im Fall 6 mit einer Eosinophile von 9 Prozent im Blut fehlen sie dagegen im Sputum völlig; ebenso in den Fällen 13 und 46. Aus diesen wenigen Beispielen ist schon ersichtlich, daß niemals eine einmalige Untersuchung oder gar nur ein Blutbild oder das Sputum allein Aufschluß über die Eosinophilie geben können.

Was nun die Verteilung der Krankheitsfälle auf Männer und Frauen anbetrifft, so sind unter den 69 Fällen nur 11 Frauen bzw. Mädchen. Dieses stimmt mit den allgemeinen Beobachtungen überein und beruht auf der Tatsache, daß die Männer auf Grund ihrer beruflichen Tätigkeit in größerem Maße Schädigungen des Bronchialbaumes ausgesetzt sind als Frauen. So finden wir unter den Männern besonders Müller, Bäcker, Tabakarbeiter, Sägewerksarbeiter, Former, Steinhauer und Bergleute, kurz, meist Arbeiter aus Staubberufen. Man kann in diesen Fällen neben der direkten Schädigung der Bronchien durch die Anamnese aber auch Fälle nachweisen, die schon öfters an Bronchitis gelitten haben, bevor sie ihren Beruf ergriffen, oder in deren Familien Fälle von allergischen Erkrankungen häufig

sind. In diesen Fällen handelt es sich um eine Allergie, die auf mangelhafter Konstitution beruht.

Teichmüller war der Ansicht, daß auch der Tuberkulose eine große Bedeutung für die Entstehung der chronischen Bronchitis zukommt. Obwohl Schwenkenbecher demgegenüber diese Möglichkeit ablehnt, finden wir doch in sieben Fällen eine anamnestische Angabe über eine durchgemachte Tuberkulose. Diese Angaben sind aber mit Vorsicht zu verwerten, wie schon eingangs erwähnt. Blum sagt dazu sehr treffend: Trifft man in der Anamnese auf angeblich durchgemachte Lungentuberkulose, so ist dem mit äußerster Skepsis zu begegnen. Wissen wir doch, daß selbst eine monatelange Kur in einer Lungenheilstätte durchaus nicht immer mit einer tuberkulösen Infektion identisch ist. Selbst der Bezug einer Rente auf Grund einer angeblich im Felde erworbenen Lungentuberkulose ist durchaus noch kein Beweis.

Sonst finden wir noch anamnestische Angaben über durchgemachte Grippe, Rauchvergiftung, Einatmen von Aetherdämpfen, Gasvergiftung, Chlorgasvergiftung und Lues. Chronische Bronchitis nach Grippe ist bekannt, ebenso kann das Einatmen der verschiedenen Gase eine chronische Bronchitis zur Folge haben. Wie liegen nun die Verhältnisse bei der Lues? Abgesehen von der Tatsache, daß eine Lungenlues unter dem Bilde einer chronischen Bronchitis verlaufen kann, sind einzelne Fälle bekannt, wo bei Lues sogar eine Eosinophilie beobachtet wurde. So schildert De Simone einen Fall von kongenitaler Eosinophilie mit hämolytischem Icterus heredo — luetischen Ursprungs. Er fand hier eine Eosinophilie von 38 Prozent. Er erklärt diese merkwürdige Erscheinung, da ja die hereditäre Lues sonst ohne Eosinophilie einher geht, mit dem hämolytischen Icterus. Sie sei toxisch-anaphylaktischen Ursprungs und nicht etwa die Folge der Hämolyse.

In der Krankengeschichte Nr. 36 fand sich als Nebebefund eine ausgesprochene Neurasthenie, die wie wir bereits gesehen haben, zu dem Krankheitsbild der allergischen Erkrankungen gehören kann; die sonstigen Nebebefunde wie Pleuraerkrankungen (Nr. 22, 46, 54) und solche des Kehlkopfes (Nr. 38 und 61) gehören zu den ätiologischen Faktoren der chronischen Bronchitis. In 17 Fällen fand sich neben der chronischen Bronchitis ein Emphysem.

Von Storm van Leeuwen wird für dieses Emphysem die Bezeichnung „funktionelles Emphysem“ (Brauer) empfohlen, da es sich nach seiner Ansicht um kein echtes Emphysem handelt. Er behauptet sogar, daß es bei Asthma keine chronische Bronchitis gebe, da man nach seiner Ansicht unter chronischer Bronchitis eine primäre, durch Bakterien zustandegekommene Entzündung der Luftwege verstehe. Wie am Anfang dieser Arbeit dargelegt, spielen aber gerade die Bakterien bei der chronischen Bronchitis nur eine sekundäre Rolle. Sein Vor-

schlag, das Emphysem als funktionell zu bezeichnen, muß anerkannt werden, denn es ist eine bekannte Tatsache, daß die krankhaften Veränderungen über dem Brustkorb erheblich oder sogar ganz zurückgehen, wenn der allergisch Erkrankte sich dem Allergen fernhält oder die Erkrankung zum Heilen gebracht wird, ganz gleichgültig, wie lange das Emphysem bereits bestand.

Was nun das Alter der Patienten anbelangt, so ergibt sich für die Männer folgendes Bild: die meisten der Erkrankten stehen in einem Alter zwischen 30 und 40 Jahren (24 Fälle). Vor dem 30. Lebensjahr 7 Fälle, zwischen 40 und 50 Jahren (9 Fälle). Dann setzt wieder ein Anwachen bis auf 18 Fälle ein. Wir ersehen hieraus, daß sich in mittlerem Alter von 30 bis 40 Jahren eine besondere Neigung zur chronischen Bronchitis bemerkbar macht. Dieses hängt sicherlich mit der beruflichen Tätigkeit zusammen. Die zahlreichen Fälle im Alter über 50 Jahre sind mit der Altersbronchitis, das heißt, mit der verminderten Widerstandskraft des Organismus hauptsächlich gegen Witterungseinflüsse, zu erklären und vielleicht nur das Wiederaufflackern einer schon früher vorhanden gewesenen Bronchitis. Bei den weiblichen Patienten findet sich nach dem 50. Lebensjahr auch eine besondere Häufung (6 von 11 Fällen), während die Uebrigen über die sonstigen Lebensalter fast gleichmäßig verteilt sind. Also auch hier eine Alterserscheinung, wohingegen von einer beruflichen Schädigung in einem besonderen Lebensabschnitt nichts feststellbar ist.

Um nun zu den Blutbildern selbst zu kommen, so ist zu bemerken, daß der Wert für das Hämoglobin sich meist um die Norm herum bewegt. Nur vereinzelt finden sich Verminderungen, deren niedrigster Wert 62 ist. Bei diesem Fall wurde auch die niedrigste Zahl der Erythrocyten von 3,25 Millionen gefunden, sonst meist normale Werte.

Bei den Leukocyten sind die Werte sehr unterschiedlich. Sie liegen zwischen 3 400 und 15 300. Nimmt man als Normalwert 6 000 bis 8 000 im cbmm an, so ergibt sich, daß 29 Fälle eine normale Leukocytenzahl aufweisen, während sie bei 12 vermindert und 25 vermehrt ist. Es läßt sich also nicht behaupten, daß bei der chronischen Bronchitis eine Leukocytose oder Leukopenie typisch ist.

Auch über die basophilen Leukocyten läßt sich nichts Positives sagen. In den meisten Fällen fehlen sie; sind sie vorhanden, so schwankt ihr Wert zwischen 0,5 und 2 Prozent.

Nun zu den Eosinophilen im Blutbild. Wie schon bei der Besprechung der Eosinophilie im Sputum erwähnt, kann ein einmaliges Blutbild keinen Aufschluß über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Eosinophilie geben. So erklären sich auch die verschiedenen Angaben in der Literatur über die Prozentzahlen der Eosinophilie bei allergischen Erkrankungen. Während zum Beispiel Adams in 80 Prozent der Fälle von Asthma bronchiale eine

Eosinophilie im Blut fand, gibt Peipers nur eine solche in 63 Prozent und Page sogar nur in 10 Prozent der Fälle an. Leider war auch in den meisten unserer Krankengeschichten nur ein einziges Blutbild angefertigt worden.

Wenn man als oberste Grenze der Norm der Eosinophilen 4 Prozent oder 280 Zellen pro ccm (Morawitz) annimmt, so ergibt sich aus unserer Tabelle in 34 Fällen eine höhere Prozentzahl. Die absoluten Zahlen sind in 31 Fällen erhöht. Hieraus ersieht man, daß niemals die Prozentzahl allein, besonders bei geringfügigen Abweichungen von der normalen, die Eosinophilie anzeigen kann, sondern daß man stets die absolute Zahl zum Vergleiche heranziehen muß, um ein brauchbares Resultat zu erhalten.

In unseren 69 Fällen fand sich die Eosinophilie in folgenden Prozentsen:

keine	unter 3%	3—5%	6—10%	11—15%	16—20%	über 20%
4	22	16	23	2	—	2

Die meisten Fälle zeigen also eine Eosinophilie zwischen 6—10 Prozent. Aber auch diese Tabelle ist als ungenau anzusehen, da sie sich sicher bei wiederholter Untersuchung nach rechts verschieben würde. (Storm van Leeuwen und Z. van Niekerk).

Wir sehen also, daß fast in 50 Prozent der Fälle eine Eosinophilie vorhanden ist; diese Zahl würde sich sicherlich noch erhöhen, wenn das Blutbild öfter wiederholt würde. Hierfür spricht die Tatsache, daß in einzelnen Fällen eine Eosinophilie des Sputums vorhanden ist, ohne daß diese Zellform im Blut gefunden wird.

Die in obiger Tabelle gefundenen Werte stimmen in ihrer Anordnung ungefähr mit denen von Storm van Leeuwen überein, der bei allergischen Krankheiten am meisten Werte zwischen 5 und 10 Prozent fand. Dann folgen die Werte zwischen 3 und 5 Prozent und dann in großem Abstand die zwischen 10 und 15 Prozent. Bei typischem Asthma bronchiale finden sich am häufigsten Werte zwischen 5 und 15 Prozent. Auch ich habe daraufhin noch 22 Fälle von Asthma bronchiale durchgesehen und fand in 50 Prozent der Fälle Werte zwischen 5 und 11 Prozent.

Man sieht hieraus, daß zwischen dem Asthma bronchiale und der chronischen Bronchitis sehr nahe Beziehungen bestehen, und meiner Meinung nach hat Teichmüller vollkommen recht, wenn er die eosinophile Bronchitis als „rudimentäres Asthma“ bezeichnet. Damit wäre in bezug auf die Eosinophilie ein gewisser Hinweis auf eine Einteilung gegeben, in die sich die Mehrzahl der Bronchitiden nach mehrmaliger Untersuchung des Blutbildes und des Sputums einreihen läßt. Trotzdem wird noch eine Reihe von Fällen übrig bleiben, bei denen sich auch durch mehrmalige Untersuchung

keine Eosinophilie nachweisen läßt. Hier wird es sich um diejenigen Fälle handeln, bei denen es sich entweder um eine chronische Schädigung der Luftwege auf nichtallergischer Grundlage handelt oder um Folgen der Erkrankung der Pleura, des Kehlkopfes oder anderer benachbarter Organe.

Bei den neutrophilen Leukocyten findet sich in 12 Fällen eine kleine bis mittlere Linksverschiebung (Einteilung nach Ziemilski). Die Segmentkernigen sind meist in normaler Anzahl oder etwas vermindert. Die Lymphocyten und großen Monocyten zeigen kein einheitliches Verhalten. Meist finden wir auch hier normale Werte. In manchen Fällen bei Erhöhung der Prozentzahl der Eosinophilen findet sich auch eine geringe Lymphocytose; doch treten auch normale und subnormale Werte auf.

Ganz allgemein läßt sich sagen, daß bei den meisten Fällen von chronischer Bronchitis auf allergischer Grundlage bei sonst normalem Blutbild eine mehr oder weniger ausgeprägte Eosinophilie festgestellt werden kann, wenn auch die Eosinophilie kein unbedingt erforderliches Symptom ist.

Zum Schluß wäre noch einmal auf die Tuberkulose zurückzukommen. Es ist bekannt, daß auch bei dieser Erkrankung eine Eosinophilie auftreten kann (Michels, Romberg, Bröslamen, Raffauf). Für diese Erscheinung wird die Erklärung gegeben, daß es eine anaphylaktische Erscheinung als Ausdruck eines erhöhten Abbaues artfremden Eiweißes sein soll und daß die Eosinophile meist dann auftritt, wenn die Abwehrkräfte im Organismus die Oberhand gewinnen und nun die Heilung beginnt (Schilling). Letztere Ansicht wird aber von Redeker, Bräuning und Blum bestritten. Nach Blum soll das Auftreten der Eosinophilen oft der Ausdruck eines Ueberempfindlichkeitszustandes sein, in welchem sich häufig neue Herde bilden oder alte Herde wieder aufflackern oder einschmelzen. Es kann sowohl eine Heilung als auch eine Verschlechterung folgen. Da es sich also um einen Ueberempfindlichkeitszustand handelt, muß man meiner Meinung nach bei der Vornahme von Cutanproben, wie sie bei allergischen Krankheiten häufig vorgenommen werden, mit größter Vorsicht vorgehen, werden doch beim Testen kleinste Mengen Eiweißes reforbiert, die als unspezifischer Reiz die Tuberkulose zwar günstig aber auch ungünstig beeinflussen können. Man sollte daher Personen, die an fortschreitender Tuberkulose leiden, am besten gar nicht testen. Wenn man die Rundfrage Kämmerers über die Ergebnisse der Cutanproben durchsieht, dann muß man zu der Ansicht kommen, daß die erzielten Resultate noch recht unbefriedigend sind, und daß man von den Cutanproben in den meisten klinischen Anstalten wieder abgekommen ist. Die positiven Ergebnisse, die wirklich mit dieser Untersuchungsmethode erzielt wor-

den sind, wären sicherlich auf Grund einer genauen Anamnese und Untersuchung auch zu erzielen gewesen.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß chronische Bronchitiden bei Psycholabilen, Neuropathen und Asthenikern verhältnismäßig häufig sind. Der Wunsch nach einer Verforgung spielt für die Beurteilung der chronischen Bronchitis im Rentenverfahren eine große Rolle. Dieselbe Beobachtung läßt sich auch mit Beginn des Winters bei den Handwerksburschen anstellen.

Die chronische Bronchitis ist eine Erkrankung, welche, abgesehen von einigen wenigen Fällen, bei denen eine andere Ätiologie in Frage kommt, meist auf eine Organminderwertigkeit zurückzuführen ist, wobei Konstitution und Vererbung eine wichtige Rolle spielen.

Eosinophiler Katarrh und Asthma sind wesensgleiche, wenn auch verschiedenen starke Reaktionen des Organismus. Man kann den eosinophilen Katarrh als „rudimentäres Asthma“ bezeichnen.

Ueber das Blutbild selbst ist zu sagen, daß ein Fall mit hochgradiger Eosinophilie im Blut (56 Prozent) und im Sputum längere Zeit hindurch beobachtet wurde und daß während dieser Zeit eine Norm für die Beziehungen zwischen dem Schwanken der Eosinophilen und der Aenderung im Befinden nicht festgestellt werden konnte. Zwar bedingt das bessere Befinden manchmal ein Sinken der Prozentzahl der Eosinophilen, die Verschlechterung dagegen ein Ansteigen, doch zeigen sich Unterschiede zwischen dem Verhalten der Prozentzahlen und den absoluten Zahlen.

Auch über einen Zusammenhang zwischen Temperaturschwankung und einer solchen der Eosinophilen konnten keine Feststellungen gemacht werden, da höhere Grade von Fieber nicht auftraten.

Bei der Betrachtung des Verhaltens der einzelnen Arten der Leukocyten untereinander kann festgestellt werden, daß die Schwankung der Eosinophilen derjenigen der Lymphocyten parallel, derjenigen der Segmentkernigen entgegengesetzt verläuft.

Die Kernform der Eosinophilen des Blutes ist dieselbe wie die im Sputum. Die Ansichten von Hajos, der für die eosinophilen Zellen und die Charkot-Leydenschen Kristalle eine gemeinsame Grundsubstanz annimmt, kann ebensowenig bestätigt werden, wie die von Stäubli, welcher annimmt, daß die Charkot-Leydenschen Kristalle aus zerfallenen eosinophilen Zellen entstehen, da in unserem Falle, trotz hochgradiger Eosinophilie des Blutes und des Sputums niemals Charkot-Leydensche Kristalle gefunden wurden.

Es wurde eine ausgesprochene Leukocytose beobachtet, ebenso wie in 25 von 66 weiteren Fällen; 29 Fälle wiesen eine normale Leukocytenzahl auf, 12 eine Leukopenie.

In 50 Prozent der Fälle war eine Eosinophilie vorhanden, doch würde sich diese Zahl bestimmt erhöhen, wenn Gelegenheit zu einer öfteren Wiederholung des Blutbildes gewesen wäre. Ein einmaliges Blutbild kann, ebenso wie eine einmalige Untersuchung des Sputums, keinen Aufschluß über eine eventuell bestehende Eosinophilie geben, da, wie bekannt, jedes einzelne Symptom der chronischen Bronchitis zeitweise fehlen kann. In den meisten Fällen von chronischer Bronchitis auf allergischer Grundlage wird sich eine Eosinophile feststellen lassen.

Um die über Aetiologie und Therapie wenig Aufschluß gebende, jetzt gebräuchliche Einteilung der chronischen Bronchitiden nach der Beschaffenheit des Sputums zu verbessern, würde es sich empfehlen, auf Grund des Blutbildes sie in solche mit oder ohne Eosinophilie, das heißt, in allergische oder nicht allergische Bronchitiden einzuteilen. :

Literatur.

- Brugsch, Th.*: Lehrbuch der inneren Medizin.
Morawitz, A.: Klinische Diagnostik innerer Krankheiten.
Strümpell - Seyfarth: Lehrbuch der speziellen Pathologie und Therapie der inneren Krankheiten.

—:—

- Brugsch, Th.*: Allergische Darmerkrankungen.
Med. Klin. 39, 1435. (1930)
Mayerhofer, E.: Pirquets Allergiebegriff und seine Entwicklung bis 1929.
Erg. inn. Med. 36, 241. (1929)
Munter, H.: Diagnose und Therapie der Ueberempfindlichkeitskrankheiten.
Med. Klin. 30, 1152. (1928)
Storm van Leeuwen: Ueber Allergie und Allergene.
Verlag der Sächs. Serumwerke.
Wurmfeld, R.: Allergische Erkrankungen der Haut.
Med. Klin. 35, 1284. (1930).

—:—

- Schwenkenbecher, A.*: Der eosinophile Bronchialkatarrh.
Z. physik. Ther. 37, 181 (1929)
Lederer, R.: Chronische Bronchitis, Bronchialasthma und Bronchotomie.
Erg. inn. Med. und Kinderheilk. 19, 564. (1921)
Danach zitiert: Henoch
Heubner
Feer
Meyer, M.
Rachford
Allan
West
Miller
v. Müller
Hoffmann
Bergstrand, Hilding: Zur Pathologie des Asthma bronchiale.
Acta path. scand. 5, 251 (1929) Kongr. Zentralbl. 54.
Stäubli, K.: Die klinische Bedeutung der Eosinophilie.
Erg. inn. Med. und Kinderheilk. 6, 192. (1910)
Breinl, F.: Allergie, Anaphylaxie und Idiosynkrasie.
Med. Klin. 30, 1108. (1930)
Farmer, Loeb, L.: Ueber Asthma bronchiale und über allergische Hautmanifestationen.
Z. klin. Med. 110, 184. (1929)

- Kolmer, J. A.*: A critical review of the mechanism and terminologie of allergie.
J. labor. a. clin. med. 13, 905 (1928) Kongr. Zentralbl. 52.
- Balyeat, R.*: The hereditary factor in allergie diseases.
Amer. j. med. sci. 176, 332 (1928) Kongr. Zentralbl. 53.
- Ratner, Bret and Helen Lee Gruchl*: Transmission of respiratory anaphylaxis (asthma) from mother to offspring.
J. of exper. med. 49, 833 (1929) Kongr. Zentralbl. 54.
- Teichmüller*, Die eosinophile Bronchitis.
Dtsch. Arch. klin. Med. 63, 444. (1899)
- Teichmüller*: Das Vorkommen und die Bedeutung der eosinophilen Zellen im Sputum.
Dtsch. Arch. klin. Med. 60, 576 (1898)
- Mayr, J. und Monkorps, C.*: Studien zur Eosinophilie.
Virch. Arch. f. pathol. Anat. 256, 19 (1925)
264, 774 (1927)
- Mayr, J. und Monkorps, C.*: Eosinophilie und Milz.
Münch. Med. Wochenschr. 45, 1777 (1926)
- Storm van Leeuwen, W. K. Krause und O. N. Tiffot van Patot*: Ueber die Ueberempfindlichkeit gegen Hausstaub.
Ztschr. f. Immunforschg. 62, 390 (1929)
Kongr. Zentralbl. 55.
- Storm van Leeuwen und Brutel de la Rivière*: Hausstaub als Asthma-ursache.
Münch. Med. Wochenschr. 24, 990. (1929)
- Storm van Leeuwen und van Niekerk*: Ueber die Bluteosinophilie bei Allergikern.
Ztschr. exp. Med. 63, 393. (1928)
- Storm van Leeuwen und C. J. Storm*: Ueber den Begriff des funktionellen Emphysems und seinen Wert für die Diagnose und Prognose beim Asthmatischer.
Münch. Med. Wochenschr. 1, 401. (1929)
- Nägeli*: zitiert nach Mayr und Monkorps.
- Hajos, K.*: Beiträge zur Eosinophilie.
Ztschr. gef. exp. Med. 59, 383 und 389. (1928)
- Hajos, K. und Zoltan Enyedy*: Beiträge zur Pathogenese des Asthma bronchiale.
- Hajos, K., Nemeth L. und Enyedy, Z.*: Ueber den Einfluß der direkten Vagusreizung auf die Eosinophilie und auf die Leberstruktur.
Ztschr. gef. exp. Med. 48, 590. (1926)
- Weidenreich*, Zitiert nach Schlecht.
- Pavel, J. et Brancovici*: Contribution à l'origine des éosinophiles dans le syndrome de l'éosinophilie pleurale.
Sang. J. 2, 4 (1928) Kongr. Zentralbl. 50.

- Schlecht, H.*: Eosinophilie und Allergie.
Med. Klin. 36, 1304. (1931)
- Liebreich, E.*: In vitro-Verfuche über Eosinophilie.
Kli, Wo. 5, 194. (1923)
- Mount, Harry*: Experimental study of the effects of stimulation and section of the vagal innervation to the bronchians and their possible relation to asthma.
Amer. J. med. sci. 177, 697. (1929) Kongr. Zentralbl. 54.
- Schwenker*:
Schlecht:
Garath:
} zitiert nach Mayr und Monkorps.
- Gasset, I.*: Ueber die Rolle der Milz bei der Entstehung und Regulierung der Eosinophilen.
Arch. internat. med. 41, 683 (1928) Kongr. Zentralbl. 51.
Kongr. Zentralbl. 49.
- Luzzatto, A.*: Su un singolare reperto d'intensa eosinophilia a carattere sistematizzato.
Haematologica. J. 461 (1926) Kongr. Zentralbl. 45.
- Waldbott, G.*: Roentgen-ray treatment of the spleen in asthma and in related allergic diseases.
Arch. d. cardiol. y haematol. 8, 517 (1927)
- Waldbott, G.*: Allergic bronchitis.
J. labor. a. clin. med. 13, 943 (1928) Kongr. Zentralbl. 51.
- Holst, L. und Kaplunowa, D.*: Die Roentgenbehandlung des Asthma bronchiale durch Milzbestrahlung.
Strahlentherapie 32, 505. (1929)
- Türk*
Stäubli
Zappert
Arneth
Ziegler
} zitiert nach Mayr und Monkorps.
- Klinkert, D.*: Bedeutung der Reconvalescens-Eosinophilie.
Ztschr. clin. Med. 172 (1920)
- Klinkert, D.*: Das Problem der konstitutionellen Eosinophilie.
Ztschr. clin. Med. 156 (1920)
- v. Noorden*: Beiträge zur Pathologie des Asthma bronchiale.
Ztschr. clin. Med. 20, 98. (1892)
- Uffenheimer, A.*: Anfallsbereitschaft und Eosinophilie.
Münch. Med. Wochenschr. Jg. 75. 15, 639 u. 16, 697 (1928)
- Heinicke, A. und Deutschmann, Fr.*: Das Verhalten der weißen Blutzellen während des Asthmaanfalles.
Münch. Med. Wochenschr. 797. (1906)
- Baagoe, K.*: Eosinophil cells in the blood of normal and asthmatic children.
Amer. journ. of dis. of childr. 35, 171. 1928)
Kongr. Zentralbl. 51.

- Ziemilski, B.:* Die Bedeutung des Haemogramms nach Schilling für Diagnose und Therapie.
Ztschr. clin. Med. 101, 105. (1925)
- v. Strümpell, A.:* Ueber das Asthma bronchiale und seine Beziehungen zur sogenannten exsudativen Diathese.
Med. Klin. 23, 889. (1910)
- Blum, R.:* Zur Kenntnis des eosinophilen Bronchialkatarrhs.
Beitr. Klin. d. Tuberk. 78, 730. (1931)
- De Simone, D.:* Etio-patogenesi della eosinofilia.
Gazz. internaz. med. chir. 19, 218 u. 28, 205 (1923).
Kongr. Zentralbl. 41.
- Adam, J.:* Notes on 1500 cases of asthma.
Brit. med. j. 3725, 973. (1932) Kongr. Zentralbl. 66.
- Peipers, A.:* Eosinophilie und Allergie.
Dtsch. Arch. klin. Med. 169, 65. (1930)
- Page, J., Kenneth B. Turner and Jessi H. Wilson:* The clinical significance of eosinophilie on a general medical service.
J. labor. a. clin. med. 13, 1109. (1928)
Kongr. Zentralbl. 52.
- Graß, H. und Simmert, H. U.:* Die Rolle der Eosinophilen im tuberkulösen Geschehen.
Kli. Wo. 31, 1457. (1931)
danach zitiert: *Brösamler,*
Raffauf,
Redeker,
Bräuning.
- Redeker, Fr.:* Allergie und Tuberkulose vom Standpunkt des Klinikers aus.
Beitr. klin. Tuberk. 70, 259 u. 290 (1928).
- Kämmerer, H.:* Zur Klinik der allergischen Krankheiten.
Med. Klin. 32, 1175. (1930)

Lebenslauf

Am 10. Juni 1904 wurde ich als Sohn des prakt. Arztes Dr. med. Gotthilf Becker und seiner Ehefrau Elise, geborene Maue, in Grünberg in Hessen geboren. Nach dreijährigem Volksschulbesuch ging ich zur Höheren Bürgerschule bis zur Quarta. Nach Umzug meiner Eltern nach Jüterbog besuchte ich die dortige Staatliche Schillerschule und bestand am 17. März 1922 die Reifeprüfung. Ich studierte nun Medizin an den Universitäten Berlin, Halle und Leipzig, bestand am 12. 5. 1926 das Vorexamen in Leipzig und am 14. 5. 1930 das Staatsexamen in Göttingen mit: Gut. Im praktischen Jahr arbeitete ich in der Medizinischen Universitätsklinik in Halle und im Allgemeinen Krankenhaus in Bitterfeld.

